



Efekt na **Plus**

Szybko na ból gardła.



www.krkapolska.pl

**Septolete® plus**

**KRKA**

SEPTOLETE PLUS i SEPTOLETE PLUS O SMAKU MIODU i LIMONKI: 1 pastylka twarda zawiera 5 mg benzokainy i 1 mg chlorku cetylopirydyniowego. Wskazania: stosuje się w celu odkażania i łagodzenia bólu w lekkich zakażeniach jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na benzokainę, chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek ze składników leku. SEPTOLETE PLUS AEROSOL DO STOSOWANIA W JAMIE USTNEJ: Skład: Każdy ml roztworu do stosowania w jamie ustnej zawiera 10 mg benzokainy i 2 mg chlorku cetylopirydyniowego. Wskazania: stosuje się w celu odkażania i łagodzenia bólu w lekkich zakażeniach jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne środki znieczulające miejscowo. Uzależnienie od alkoholu. Methemoglobinemia. Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6; 8501 Novo mesto; Słowenia.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Efekt na **Plus**

Szybko na ból gardła.



www.krkapolska.pl

**Septolete® plus**

**KRKA**

SEPTOLETE PLUS i SEPTOLETE PLUS O SMAKU MIODU i LIMONKI: 1 pastylka twarda zawiera 5 mg benzokainy i 1 mg chlorku cetylopirydyniowego. Wskazania: stosuje się w celu odkażenia i łagodzenia bólu w lekkich zakażeniach jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na benzokainę, chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek ze składników leku. SEPTOLETE PLUS AEROL DO STOSOWANIA W JAMIE USTNEJ: Skład: Każdy ml roztworu do stosowania w jamie ustnej zawiera 10 mg benzokainy i 2 mg chlorku cetylopirydyniowego. Wskazania: stosuje się w celu odkażenia i łagodzenia bólu w lekkich zakażeniach jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne środki znieczulające miejscowo. Uzależnienie od alkoholu. Methemoglobinemia. Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6; 8501 Novo mesto; Slowenia.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.